

## 第45回名古屋市薬剤師会研修会 症例

### 【設問】

この処方で問題ないですか？

以下の患者データをもとにご検討ください。

もし問題があるとしたら、医師への処方提案を根拠をもって挙げてください。

年齢 79歳  
 体重 53.3kg  
 身長 156cm  
 性別 男性

前回処方（6週間前） ティーエスワン配合OD錠の用量は前回と同用量（単独療法）

前回検査値 Ccr(クレアチンクリアランス) 61 (mL/分)

患者からの情報： 最近、下痢があるのと口内炎もできます。

### 【処方】

RP1. ティーエスワン配合OD錠T25 4錠  
 分2 朝・夕（食後30分） 28日分

RP2. ビオスリー配合錠 3錠  
 分3 朝・昼・夕（食後30分） 28日分

RP3. ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 2C  
 下痢の時 10回分  
 4時間あけて使用可

※別途算出したCcr (mL/分)

10/6 45.6  
 8/25 61

【検査項目】	結果(10/6)	単位
eGFR	55.8 □	90~110ml/分/1.73m <sup>2</sup>
Cr (クレアチニン)	0.99	男：0.65~1.07mg/dL 女：0.46~0.79mg/dL
シスタチンC	—	男：0.70~1.15mg/dL 女：0.58~0.96mg/dL
AST (旧GOT)	16	13~30U/L
ALT (旧GPT)	11	男：10~42U/L 女：7~23U/L
ALP	195	115~359U/L
T-Bil (総ビリルビン)	0.4	0.4~1.5mg/dL
K	4.3	3.6~4.8mmol/L
WBC (白血球)	4.4	3.3~8.6×10 <sup>3</sup> /μL
SEG (好中球)	61.6	40.0~70.0%
HGB (血色素)	9.3 □	男：13.7~16.8g/dL 女：11.6~14.8g/dL
PLT (血小板)	465 □	158~348×10 <sup>3</sup> /μL
CK	60	男：59~248U/L 女：41~153U/L
HbA1c	—	4.9~6.0%

注意が必要な薬剤と検査値情報の組合せ

⇒ ティーエスワン配合OD錠T25

腎機能 (eGFR, Cr, シスタチンC)

肝機能 (AST, ALT, ALP, T-BILL)

骨髄抑制 (WBC, SEG, ST., HGB, PLT)

### 【注意】

eGFRは体表面積補正值、Ccrは

体表面積未補正值で表示